

**140 Urogallo común****UROGALLO COMÚN** (*Tetrao urogallus*)**IDENTIFICACIÓN**

**Macho** 86-110 cm.; **hembra** 60-75 cm. **Macho** con cabeza y cuello gris oscuro; dorso negro, con jaspeado gris; pecho negro; coberteras del ala pardas; cola negra con jaspeado claro; pico blanco. **Hembra** con plumaje pardo, con ribeteado blanco en cabeza, cuello y obispillo; alas pardas; cola pardo rojiza con barreado negro; pico pardo.

**ESPECIES SIMILARES**

No hay confusión posible con ninguna otra especie.

**EDAD**

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

**Juveniles** sólo durante un corto periodo de tiempo, con plumaje descrito en **SEXO**.

**1º año otoño/2º año primavera** con aspecto similar a los **adultos**, pero el **macho** con plumas de la cola cortas y estrechas, pobremente moteadas de blanco; capirote, parte posterior del cuello y lados de la cabeza fuertemente vermiculados de gris; con límite de muda entre las dos primarias **juveniles** más externas retenidas y las plumas vecinas; coberteras del ala muy marrones. **Hembra** similar a la **hembra adulta**, pero con plumas de la cola marrón claro y estrechas; con límite de muda entre las dos primarias **juveniles** más externas retenidas y las plumas vecinas.

**Adulto** con plumas corporales como las descritas en **SEXO**; primarias sin límite de muda; plumas de la cola anchas, con moteado blanco en el **macho** y de color marrón oscuro en la **hembra**.

**SEXO**

**Macho** inconfundible con plumaje gris oscuro; pecho verde-azulado metálico; partes inferiores del flanco y vientre con moteado blanco; cola negra; plumas de vuelo y coberteras alares marrones; pequeñas coberteras formando una mancha blanca en el codo del ala; carúncula sobre el ojo rojo brillante; pico amarillo claro; ala mayor de 350 mm. **Hembra** con plumaje marrón oscuro, muy barreado de ante claro; pecho de color canela con moteado marrón y bordes blancos, que es más ancho en las partes inferiores del flanco y vientre; cola muy barreada de marrón oscuro con puntas claras; plumas de vuelo marrón claro; coberteras alares marrón claro moteadas de ante; carúncula sobre el ojo rojo apagado; pico marrón grisáceo; ala menor de 284 mm.

Los **juveniles** se pueden sexar utilizando el diseño del plumaje: **macho** con capirote y cuello ante gris; partes superiores marrón claro, barreadas y vermiculadas de marrón oscuro; garganta gris claro, barreada de negro; coberteras del ala moteadas de ante marrón con triángulos ante claro en la punta. **Hembra** con capirote y cuello ante marrón; partes superiores similares a las del **macho** pero con diseño más marcado; garganta ante claro, con fino moteado negro; coberteras del ala similares a las del **macho** pero con diseño más marcado.

**MUDA**

Muda **postnupcial** completa; generalmente terminada en octubre. Muda **postjuvenil** parcial, permaneciendo retenidas las dos primarias más externas; generalmente terminada en septiembre.

**FENOLOGÍA**

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

**ESTATUS EN ARAGÓN**

Sedentario, con presencia en la parte oriental del Pirineo asociado a bosques bien conservados.