

154 Calamón común



CALAMÓN COMÚN (*Porphyrio porphyrio*)

IDENTIFICACIÓN

40-48 cm. **Adulto** con plumaje azul púrpuro; infracoberteras caudales blancas; escudete, pico y patas rojos. **Juvenil** con plumaje gris pizarra, con partes inferiores más claras; pico gris azulado con tintes rojizos; patas rojas.

ESPECIES SIMILARES

El tamaño y el color azulado del plumaje hacen inconfundible a esta especie.

SEXO

Plumaje similar. El tamaño puede separar la mayor parte de los ejemplares: **macho** con ala mayor de 265 mm; **hembra** con ala menor de 250 mm (**CAUTION:** el tamaño en **juveniles** generalmente como en el **adulto** pero el ala es ligeramente más corta en algunos ejemplares).

MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada en septiembre. La muda **postjuvenil** es parcial, cambiando las plumas del cuerpo; suele estar terminada antes de octubre. Existe una muda **prenupcial** en ambos tipos de edad que abarca sólo plumas del cuerpo.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juveniles con el manto gris oscuro; resto de partes superiores y coberteras del ala azul violeta apagado; mentón blanco sucio; flancos grises; al principio con pico rojo apagado, después rojo brillante pero con una zona oscura a los lados; iris marrón rojizo; patas rojo ocre apagado.

1º año otoño/2º año primavera con plumaje similar al de los **adultos**, pero cabeza y partes superiores con color violeta azulado ligeramente más apagado; pecho y partes inferiores con gris y blanco mezclados; las plumas de vuelo son **juveniles** retenidas y estarán más desgastadas que en los **adultos**.

Adultos con el manto azul violeta; resto de partes superiores y coberteras del ala azul violeta puro; mentón azul cobalto; pico rojo intenso; iris rojizo; patas rojas.

ESTATUS EN ARAGÓN

Extinto como nidificante en Aragón, existen datos de reproducción de la especie en la Laguna de Sariñena.