

178 Chorlito gris

CHORLITO GRIS (*Pluvialis squatarola*)

IDENTIFICACIÓN

27-28 cm. En primavera con color negro en las partes inferiores; dorso pardo negruzco, con barredado blanco. En otoño con partes inferiores claras, con manchas pardas en pecho y flancos; en ambos plumajes con banda clara en el ala y axilares oscuras.

ESPECIES SIMILARES

Parecido al **chorlito dorado**, que carece de axilares negras, ancha barra blanca en el ala y de obispillo blanco.



Chorlito dorado

SEXO

En plumaje **nupcial**, **macho** con partes inferiores negras con algunas motas blancas; infracoberteras de la cola con barras pequeñas. **Hembra** con partes inferiores marrón-negro con amplio moteado blanco; infracoberteras de la cola con barras grandes (**CUIDADO**: ocasionalmente ambos sexos son bastante similares). En plumaje **no nupcial** ambos sexos difíciles de separar con seguridad.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juveniles con partes superiores y coberteras del ala con plumas gris marrón bordeadas con una banda dorada o amarillo claro; partes inferiores blancas; pecho y flancos con intenso barredado ante marrón.

2º año generalmente con plumaje de **invierno**; plumas de vuelo juveniles, que estarán desgastadas y siempre de una sola generación; frecuentemente con medianas coberteras del ala juveniles retenidas, que tendrán puntos crema muy claros.

Adultos inconfundibles con su plumaje **nupcial**, con partes superiores de color plateado y gris oscuro y partes inferiores negras; a veces con dos generaciones de primarias.

MUDA

Habitualmente con muda **postnupcial** completa, que comienza en las zonas de cría con sólo algunas plumas de la parte inferior del manto, escapulares, partes inferiores, medianas coberteras y primarias internas; después se detiene para migrar y termina en las áreas de invernada (**CUIDADO**: algunos ejemplares, más en **machos** que en **hembras**, pueden dejar sin mudar algunas primarias externas). La muda **postjuvenil** es parcial incluyendo sólo las plumas del cuerpo y algunas coberteras del ala; comienza por lo general en las zonas de invernada. Sólo los adultos tienen una muda **prenupcial** que incluye las plumas corporales y coberteras del ala, ya que las aves de **2º año** mantienen el plumaje de **invierno**.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Especie de paso, con presencia poco abundante en orillas de zonas húmedas y arrozales.