

## FUMAREL COMÚN (*Chlidonias niger*)

### IDENTIFICACIÓN

23-24 cm. En primavera, plumaje oscuro, gris y negro; coberteras caudales inferiores blancas; alas claras por debajo; pico y patas negros. En otoño plumaje gris en el dorso; partes inferiores blancas.

### ESPECIES SIMILARES

Es una especie inconfundible en **plumaje nupcial** debido a su color oscuro. En plumaje **no nupcial** recuerda un **fumarel cariblanco**, que carece de tinte oscuro en las pequeñas coberteras del ala y en las primarias externas. El **juvenil** de **fumarel cariblanco** tiene las plumas del dorso con borde castaño.

### SEXO

En **plumaje nupcial, macho** con brillo verdoso en el capirote y nuca; cabeza y cuello negro azabache; manto negro contrastando con los más pálidos obispillo y coberteras del ala; mentón y garganta gris oscuro; generalmente con la barba externa de la rectriz más externa de color gris claro. **Hembra** sin brillo verdoso en el capirote y nuca; cabeza, cuello y manto sin contrastar con el resto del dorso y coberteras del ala; mentón y garganta gris claro; generalmente con la barba externa de la rectriz más externa sin color gris claro. **CUIDADO:** unos pocos **machos** tienen el pecho y vientre tan claro como las **hembras**, pero pueden reconocerse por los lados de la cabeza más oscuros y sin contraste con el mentón y garganta claros.

Los **adultos** en plumaje **no nupcial** en otoño, los ejemplares de **2º año** y los **juveniles** no se pueden sexar utilizando el diseño del plumaje.

### EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

**Juvenil** con plumas del manto y escapulares marrón gris con bordes ante; medianas coberteras gris oscuro con puntas que van del marrón al blanco sucio; escapulares y terciarias con amplios bordes blancos.

**2º año** similar al **adulto no nupcial** pero con algunas plumas oscuras en el cuerpo; generalmente con dos generaciones de primarias, las externas más desgastadas que las internas.

**Adulto** en **primavera** con plumaje negro o gris pizarra; en **otoño** con plumas del manto y escapulares grises sin bordes ante; medianas coberteras grises sin puntas de otro color; escapulares y terciarias de color gris claro

### FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

### ESTATUS EN ARAGÓN

Especie en paso. Puede encontrarse en los grandes ríos, lagunas y embalses de la Comunidad.

## 250 Fumarel común

### MUDA

Muda **postnupcial** completa, cambiando en las áreas de cría la mayor parte de las plumas corporales y las primarias externas (generalmente 5 ó 6), después suspende la muda para la migración otoñal y la termina en las zonas de invernada. La muda **postjuvenil** es completa y raramente empieza antes de alcanzar las áreas de invernada (**CUIDADO:** algunos ejemplares **juveniles** retienen plumas de vuelo hasta su primera muda **postnupcial**). Ambas clases de edad tienen una muda **prenupcial** parcial con la que los **adultos** adquieren el **plumaje nupcial** y las aves de **2º año** cambian sólo algunas plumas corporales (**CUIDADO:** las aves jóvenes adquieren su primer **plumaje nupcial** oscuro en su **3º año** de vida).