

361 Zarcero pálido

SEXO

Sexos similares, no siendo posible diferenciarlos por el plumaje.

MUDA

Muda **postnupcial** y **postjuvenil** completa que tiene lugar en los cuarteles de invernada africanos, siendo después indistinguibles por el plumaje.

EDAD

Pueden reconocerse 2 tipos de edad:

Juveniles con plumaje nuevo; puntos negros en la lengua.

Adultos con plumaje desgastado; lengua sin marcas.

En primavera, después de la muda **posnupcial/postjuvenil** no es posible datar la edad utilizando el plumaje.

ZARCERO PÁLIDO (*Iduna pallida*)

IDENTIFICACIÓN

12-13 cm. Dorso pardo grisáceo; partes inferiores blancuzcas, con tinte cremoso; ceja blancuzca; pico pardo y patas gris azuladas; flancos pardos; cola con las plumas externas más claras y punta blanca; con cerdas en la comisura de la boca.

ESPECIES SIMILARES

De la misma estructura que el **carricero común**, marrón y con las axilares de color beige y el **zarcero común**, con las rectrices externas sin terminar en una mancha clara; el **mosquitero musical** es también amarillo, pero tiene la ceja más marcada y el pico más fino.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Especie estival muy localizada en lugares cálidos del centro de la Comunidad.

Zarcero común



Carricero común.

Mosquitero musical.

