


AGATEADOR NORTEÑO (*Certhia familiaris*)

IDENTIFICACIÓN

11-13 cm. Partes superiores pardas estriadas de blanco; obispillo ocre; cabeza con ceja blanca y pico largo y ligeramente recurvado; garganta blanca y partes inferiores blanco-grisáceas, con flancos ocre; pluma más grande del álula generalmente sin una línea blanca recorriendo toda su parte exterior; manchas ocre del ala con punta redondeada; puntas claras de las primarias internas amplias y sin forma de rombo; cola característica de color pardo; uña posterior 7,6-11,5 mm.

ESPECIES SIMILARES

El **agateador común** es muy similar y difícil de separar en ocasiones: la uña posterior es más corta (6,8-8,9 mm); la pluma más grande del álula suele tener una línea blanca continua en su margen; las manchas ocre del ala suelen tener punta en forma de sierra y las puntas claras de las primarias internas es estrecha y con forma de rombo.



Agateador común

SEXO

Ambos sexos son de plumaje similar, no siendo posible su diferenciación.

EDAD

Pueden reconocerse 2 tipos de edad:


Juveniles con aspecto parecido al de los **adultos**, si acaso con dorso más punteado; pecho blanquecino con algunas plumas marronáceas; plumaje nuevo.

Adultos con dorso con aspecto estriado; pecho de tonalidad ante-marrón.

CUIDADO: se ha citado para diferenciar la edad la forma de la punta clara de la cobertera primaria más larga, que es pequeña y redondeada en **adulto** y con forma de gota en **juveniles**, si bien se recomienda cuidado en el uso de este carácter.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada hacia primeros de septiembre. La muda **postjuvenil** es parcial incluyendo las plumas del cuerpo, pequeñas y medianas coberteras, terciarias y todas las grandes coberteras; suele estar completada entre agosto y octubre.



Agateador norteño. Extensión de la muda postjuvenil.

■ Todos los ejemplares
■ Algunos ejemplares

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Es una especie sedentaria presente en hayedos y abetales del Pirineo occidental.