

**75** **Ánade friso****EDAD**

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

**Juveniles** con muescas en las plumas de la cola, bordeadas de blanco; medianas y grandes coberteras estrechas; terciarias cortas, marrón gris con puntas más pálidas.

**1º año otoño/2º año primavera** con aspecto de **adulto**, pero retienen plumas en ala y cola, que estarán desgastadas.

**Adultos** con las plumas de vuelo poco desgastadas; coberteras del ala anchas y de punta redondeada; terciarias largas y puntiagudas, gris claro en **machos**, marrones en **hembras**.

**ÁNADE FRISO** (*Anas strepera*)**IDENTIFICACIÓN**

46-56 cm. **Macho** en invierno de color pardo-gris; vientre blanco; parte inferior trasera de color negro; alas grises con mancha castaña; espejuelo blanco y negro, bordeado de negro en la parte anterior. **Hembra** de color pardo, con motado y rayado oscuro; espejuelo como el macho.

**ESPECIES SIMILARES**

**Macho** con plumaje inconfundible. El diseño del espejuelo del ala diferencia a la **hembra** del resto de los ánades pardos.

**SEXO**

**Macho** en plumaje **nupcial** inconfundible, de color general gris; parte inferior del vientre negra; coberteras medias del ala de color castaño. **Macho** en plumaje **no nupcial** similar a la **hembra**, pero el espejuelo es más grande, la mancha castaño en las medianas coberteras más amplia y las escapulares más cortas vermiculadas. **Hembra** de color pardo; parte inferior del vientre marrón moteado de oscuro; coberteras medias del ala sólo ligeramente de color castaño y las escapulares más cortas nunca vermiculadas. Los **juveniles** pueden sexarse: **macho** con medianas coberteras con estrías onduladas claras y puntas castaño; **hembras** con medianas coberteras con barreado regular y puntas más pálidas con la mancha castaño, si la hay, sólo en la punta de las coberteras más externas.

**MUDA**

Muda **postnupcial** completa, adquiriendo el plumaje de eclipse, que suele estar terminado en julio en los machos y en agosto en las hembras. La muda **postjuvenil** es parcial, cambiando las plumas del cuerpo y a veces la cola; terminada entre agosto y octubre. Ambas clases de edad, a partir de septiembre, tienen una muda **prenupcial** parcial en la que adquieren el plumaje de cría.


**FENOLOGÍA**

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

**ESTATUS EN ARAGÓN**

Especie invernante poco numerosa, con algunos ejemplares reproductores en la Cuenca de Gallocanta, principalmente, en los años en que la zona presenta condiciones apropiadas para la especie.


# 75 Ánade friso



Ánade friso. Adulto. Hembra: diseño de la cola (02-II).



Ánade friso. Adulto. Hembra: diseño de secundarias (02-II).



Ánade friso. Adulto. Hembra: diseño de primarias (02-II).

Ánade friso. Adulto. Hembra: diseño de las coberteras del ala (02-II).



Ánade friso. Adulto. Hembra: diseño del ala (02-II).



Ánade friso. Adulto. Hembra: diseño de terciarias (02-II).