

PORRÓN EUROPEO (*Aythya ferina*)

IDENTIFICACIÓN

42-49 cm. **Macho** con cabeza y cuello castaños; pecho y parte posterior del cuerpo negros; alas y cuerpo grises. **Hembra** de color pardo, más oscuro en el dorso y más claro en la cabeza; alas grises.

ESPECIES SIMILARES

Macho con plumaje inconfundible. El contraste entre el cuerpo más gris que la cabeza y el pico oscuros con una línea central clara diferencia a la **hembra** del resto de los porrones.

SEXO

Macho en plumaje **nupcial** inconfundible con cabeza de color castaño-rojizo, pecho y parte trasera negros; cuerpo gris vermiculado; coberteras del ala vermiculadas de gris; iris rojizo; en plumaje **no nupcial** con diseño similar pero con los colores más apagados. **Hembra** con cuerpo marrón, más claro en cabeza y pecho; coberteras del ala gris-marrón; iris marrón o amarillo marrón. En aves **juveniles**, el **macho** con coberteras del ala, manto y escapulares ligeramente vermiculadas o con moteado claro en las puntas; punta de secundarias centrales con moteado blanco en la barba externa. **Hembra** con coberteras del ala, manto y escapulares de color gris-marrón uniforme, con un ligero moteado claro en la punta; secundarias son moteado.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juveniles con plumas de la cola estrechas; pequeñas y medianas coberteras gris-marrón uniforme, estrechas y con la punta redondeada; grandes coberteras gris marrón redondeadas y estrechas, con poco o sin moteado blanco; primarias externas estrechas sin brillo; sin estría clara detrás del ojo.

1ª año otoño/2º año primavera con plumas juveniles retenidas. **CUIDADO:** la variación individual en el tiempo de muda es grande, habiendo desde ejemplares con sólo plumas corporales cambiadas hasta otros con terciarias o plumas de vuelo mudadas.

Adultos con coberteras del ala grises, vermiculadas de blanco, anchas y con punta redondeada; **hembra** con estría clara detrás del ojo.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, adquiriendo el plumaje de eclipse, que suele estar terminada en octubre. La muda **postjuvenil** es parcial, cambiando las plumas del cuerpo; se mantiene durante todo el invierno pudiendo algunos ejemplares cambiar terciarias, todas o algunas plumas de la cola y alguna pluma de vuelo. Ambas clases de edad tienen una muda **prenupcial** parcial en la que adquieren el plumaje de cría.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Principalmente invernante, con una población reproductora muy reducida en estancas de las Cinco Villas y esporádicamente en otros lugares húmedos de la Comunidad.