

PORRÓN MOÑUDO (*Aythya fuligula*)**IDENTIFICACIÓN**

40-47 cm. En plumaje **nupcial macho** con plumaje negro; flanco y abdomen blancos; con moño largo de plumas colgantes; alas oscuras con una banda blanca; pico gris azulado. **Hembra** con partes superiores pardo oscuro, más claro en pecho y flanco; partes inferiores claras; moño corto; franja alar clara en el ala; pico gris.

ESPECIES SIMILARES

Macho con plumaje inconfundible. El color de la cabeza, uniformemente oscura, y la presencia de moño diferencia a la **hembra** del resto de los porrones.

SEXO

En plumaje **nupcial, macho** inconfundible con cabeza y pecho de color negro con brillo violeta; cabeza con moño largo; lados del cuerpo de color blanco. **Hembra** con cabeza y pecho de color marrón oscuro; cabeza con moño muy corto; lados del cuerpo de color pardo.

No es probable encontrar esta especie en Aragón en plumaje **no nupcial**.

EDAD

Desde que esta especie no cría en Aragón, sólo pueden reconocerse 2 tipos de edad:

1º año otoño/2º año primavera con una variable cantidad de plumas **juveniles** retenidas en el cuerpo, cola y alas; las coberteras alares **juveniles** retenidas son estrechas y de color marrón oscuro apagado; si se han retenido terciarias **juveniles**, entonces son cortas y marrón apagado; algunas o todas las plumas de la cola pueden ser **juveniles** retenidas.

Adulto con coberteras alares anchas y con punta redondeada, de color negro y a menudo con tonos verdosos; terciarias negras.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, adquiriendo el plumaje de eclipse, que suele estar terminada en septiembre. La muda **postjuvenil** es parcial, cambiando las plumas del cuerpo, terciarias y plumas de la cola. Ambas clases de edad tienen una muda **prenupcial** parcial en la que adquieren el plumaje de cría.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Invernante, con presencia en números bajos en cualquier laguna de la Comunidad.